



5 ЭЛЕМЕНТОВ

ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ
И ВОСТОЧНОЙ
МЕДИЦИНЫ

Отделение «Павелецкое»
115114 Москва, Летниковская 5
Тел.: +7 (495) 721 16 31
E-mail: info@50505.ru
www.50505.ru

Отделение «Раменское»
140104 Московская область,
г. Раменское, Дергаевская 26
Тел.: +7 (496) 46 50505
E-mail: info_ram@50505.ru

Что такое Прайм-Тест?

В распоряжении современной западной медицины имеется огромный массив научных данных, подтверждающих, что клиническая картина целого ряда заболеваний может значительно улучшиться при исключении из рациона определенных продуктов питания. Еще в начале прошлого столетия появилось понятие пищевой аллергии замедленного типа (скрытой пищевой непереносимости) после чего началась разработка различных методов, позволяющих выявлять продукты, вызывающие скрытую пищевую непереносимость.

Один из этих методов, применяемый в нашем центре – «Прайм-Тест». Этот метод основан на оценке индивидуальной реакции клеток крови (лейкоцитов и тромбоцитов), происходящей при взаимодействии с продуктами питания, с использованием цифрового микроскопа, обеспечивающим увеличение в 400 раз. Тестируется 150 продуктов питания. Если в течение часа происходит разрушение лейкоцитов, считается, что данный продукт вызывает у пациента аллергическую реакцию замедленного типа. Проявления этой реакции может быть различным – от головной боли или депрессии до астмы и псориаза. По результатам анализа формируется «красный» список, запрещенных к употреблению продуктов, и «зеленый» список, состоящий из разрешенных продуктов.

Результат оценивается по шкале от 0 до 4-х, где:

- 0 - нет разрушения клеток, продукт можно употреблять,
 - 1 - наблюдается повреждение и агрегация (склеивание) тромбоцитов, продукт исключается из употребления на 1 месяц.
 - 2 – при разрушении менее 25% лейкоцитов, продукт исключается из употребления на 2 месяца.
 - 3 – при разрушении более 50% лейкоцитов, продукт исключается из употребления на 3-4 месяца.
 - 4 – при разрушении более 90% лейкоцитов, продукт исключается из употребления на 6-8 месяцев и вводится в рацион только после повторного теста.
- Клиническое исследование метода по результатам независимого тестирования двумя операторами 49 пациентов (23 продукта каждому) показал очень высокую точность метода. В 78% случаев результат совпал полностью (по 4-х бальной шкале), в 16% случаев - расхождение составило 1 единицу шкалы и только в 6% - 2 единицы и более. В другом исследовании образцов крови 32 пациентов (также по 23 продукта) одним оператором в 81% случаев в течении 3-х дней подряд результаты 1-го, 2-го и 3-го дня совпали полностью.

Специальные панели с экстрактами 150 продуктов питания и химических веществ производятся в США и официально поставляются в Россию.